

リバーロキサバンOD錠「バイエル」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、血を固まりにくくすることで
血管内で血が固まって生じる疾患(血栓塞栓症)を
予防あるいは治療するためのお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物及び製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック(AG※)医薬品です。



●錠剤は実物大です。

このお薬の飲み方

必ず指示された服用方法に従って服用してください。

飲み忘れると、血栓塞栓症が起こるリスクが高くなります。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
また、ご自身の判断で服用をやめたり、飲む回数を
減らしたりしないでください。



このお薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です

- この薬は、舌の上に乗せて唾液を含ませると溶けるため、水なしで飲むことができます。また、水で飲むこともできます。
- 寝たままの状態では水なしで飲まないでください。
- 普通のお薬と同じように水で服用することもできますが、どちらの飲み方でも、効果めは変わりません。

※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは？

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物及び製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

裏面の注意事項も必ずお読みください。

服用される際は、以下の点にご注意ください

リバーロキサバンOD錠「バイエル」を服用される前に

次のような方は服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方。
- 出血している方。出血する危険性が高い方（消化管潰瘍または頭蓋内出血発症後日が浅い方。脳脊髄や眼の手術後日が浅い方。胃潰瘍や十二指腸潰瘍、気管支拡張症または肺出血の既往歴がある方。悪性腫瘍、止血障害、凝固障害がある方など）。
- 肝障害、腎障害、急性細菌性心内膜炎、低体重がある方。
- 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中である方。
- 他のお薬を使用している方（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

服用中に注意していただきたいこと

- 歯の治療、内視鏡検査や手術を受ける場合は、リバーロキサバンOD錠「バイエル」を服用中であることを、必ず事前に医師にお伝えください。
- 他の医療機関で治療を受ける場合や、市販薬を購入する場合は、リバーロキサバンOD錠「バイエル」を服用中であることを必ず医師または薬剤師にお伝えください。
- 服用中は血が固まりにくくなるため、出血しやすくなります。

以下に当てはまる場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 血便、血尿が出る
- 腫れあがるような皮下出血（あおあざ）がある
- 圧迫などの止血対策を行っても、血が止まらない、鼻血や歯ぐきからの出血が続く
- その他、出血が気になる



上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

PP-Ri_GX-JP-0065-04-02

EPRIAIP01201-1

2025年2月作成