

オルメサルタンOD錠「DSEP」 を服用される患者さんにご家族の方へ

月 日 ~ 月 日 分の
お薬がでています。

このお薬は血圧を下げるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック (AG[※]) 医薬品です。

☐ オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」

表



裏



側面



☐ オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」

表



裏



側面



☐ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」

表



裏



側面



☐ オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」


表



裏



側面



*錠剤は実物大です。

※オーソライズド・ジェネリック (AG) とは？

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

オルメサルタンOD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 肝臓・腎臓の病気にかかっている方
- 糖尿病の方、高カリウム血症の方、減塩療法中の方
- 脳出血・脳梗塞になったことのある方
- 他のお薬を服用している方

服用方法について

- このお薬は舌の上にのせるとだ液で溶けますが、口の粘膜からの吸収により効果発現を期待する薬ではありませんので、だ液や水またはぬるま湯で飲み込んでください。
- 寝たままの状態で飲む場合は、水またはぬるま湯で服用してください。
- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- このお薬は1日1回服用します。
- 2回分を一度に飲まないでください。**
飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

発疹、かゆみ、めまい、ふらつき、頭痛、しびれ、下痢、からだがだるい、咳などの症状があらわれることがあります。

その他の重要な注意

- 服用中に妊娠された場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。授乳中の方は、授乳を避けてください。
- 血圧が下がり、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高いところでの作業や車の運転など危険を伴う機械操作には十分に注意してください。**

この他にも、気になることやこのお薬について何か分からないことがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPMAGIP00701-1

2025年5月作成