

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」

を服用される
患者さんとご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、免疫細胞に働きかけ、免疫機能を調整することで、
皮膚エリテマトーデスならびに全身性エリテマトーデスの症状を緩和するお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック(AG[®])医薬品です。

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」



表

裏

側面

*錠剤は実物大です。

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」を服用される前に

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 網膜症(ただし、全身性エリテマトーデスに関連する網膜症を除く)あるいは黄斑症またはこれらの病気にかかったことがある方
- 妊娠、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他にお薬を服用している方

服用方法について

必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。

- 医師に指示された用量を、1日1回食後に服用します。1日の服用量は患者さんによって異なります。
- コップ1杯程度の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ご自身の判断で、服用する量や回数を変更しないでください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、途中で服用するのを止めないでください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が迫っている場合は1回とばし、次の通常の服用時間に1回分を服用します。1錠と2錠を1日おきに服用されている方が次に服用する際は、服用し忘れた日の分を服用してください。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。



※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは?

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

眼障害(視力の低下、視野が狭くなる、視野の中に見えない部分がある、物がゆがんで見える、視野の中心が暗くなる、色が見分けにくい)や下痢の症状があらわれることがあります。



まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 霧視、色覚障害、視野狭窄 [網膜症、黄斑症、黄斑変性]
- 水疱、皮疹、皮膚潰瘍 [中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、紅皮症(剥脱性皮膚炎)、薬剤性過敏症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、急性熱性好中球性皮膚症]
- 発熱、寒気、感染症 [骨髄抑制(血小板減少症、無顆粒球症、白血球減少症、再生不良性貧血)]
- 筋力低下、倦怠感 [ミオパチー、ニューロミオパチー]
- 脱力感、高度の空腹感、発汗 [低血糖]
- 疲れやすい、吐き気、食欲不振 [肝機能障害]

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

生活上の注意

- 視覚異常や低血糖がおこることがあるため、自動車の運転など危険を伴う機械の操作や高所での作業などには注意してください。
- 低血糖の症状がみられた時は、まず糖分(ブドウ糖、砂糖を含む食品)を補給しましょう。それでも症状が改善しない場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
- このお薬は、胎児に影響を及ぼす可能性があります。妊娠する可能性のある方は避妊することが望ましいです。

定期検査について

- 眼障害があらわれることがあるので、早期発見のため、このお薬を長期間使用する場合は、少なくとも年に1回は眼科検査を受けるようにしましょう。
- 長期間使用する場合には、定期的に骨格筋検査、腱反射検査や血液検査が必要になります。脱力の症状があらわれた場合には、使用を中止し受診してください。



連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPHYD1P01301-1
2025年11月作成