

転院される患者さん用

プラスグレル錠「DSEP」

を服用していて

転院される患者さんに

お渡しください



第一三共エスファ株式会社

プラスグレル錠「DSEP」

を服用されている患者さんにご家族の方へ

〈この用紙を転院先の医師にお見せください。〉

(患者さんの氏名)

_____ さんは、
現在、プラスグレル錠「DSEP」を以下の用量で服用しています。

【用 量】 1日1回

3.75mg 2.5mg

(いずれかを○で囲んでください)

【服用開始日】 年 月 日

【医療機関名】

【T E L】 ()

(裏面も必ずお読みください)

プラスグレル錠「DSEP」は、 血栓をできにくくして、 血管がつまるのを防ぐお薬です。

プラスグレル錠「DSEP」を服用している間は、
血が止まりにくいいため、出血に注意が必要です。

- 血が止まらないときや出血が気になるときは、自分だけで判断しないで医師に連絡してください。
- 他の病院や診療科、歯科を受診するときは、プラスグレル錠「DSEP」を服用していることを必ず医師・歯科医師・薬剤師にお伝えください。

服用にあたっての注意点

- 1日1回医師の指示通り、毎日きちんと服用してください。
- 自分の判断で中止したり、服用回数を減らしたりすることは絶対にしないでください。
- 服用し忘れた場合には、気づいたときにすぐに服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合には1回分お休みして、次の服用時間から通常通り1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。



以下のような症状があらわれた場合や、心配なことがある場合は、
遠慮しないで医師にご相談ください。

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 頭痛 | <input type="checkbox"/> 悪心・嘔吐 |
| <input type="checkbox"/> 意識が低下する | <input type="checkbox"/> 手足が動きにくくなる |
| <input type="checkbox"/> 血痰・吐血 | <input type="checkbox"/> 尿が茶色っぽくなる、血が混じる |
| <input type="checkbox"/> あざができる(紫色・赤色) | <input type="checkbox"/> ぶつぶつができる |
| <input type="checkbox"/> 眼や皮膚が黄色くなる | <input type="checkbox"/> 倦怠感(強い疲労感) |
| <input type="checkbox"/> 食欲がなくなる | <input type="checkbox"/> 黒色便や便に血が混じる |



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPEFTAGIP00401-1

2026年1月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPEFTAGIP00401-1
2026年1月作成