


モンテルカスト細粒「DSEP」 を服用される小児患者さんご家族の方へ


モンテルカスト細粒4mg「DSEP」



モンテルカスト細粒「DSEP」は、
1日1回1包を寝る前に服用してください。

服薬支援シール

お子様がお薬をのまれた際に、カレンダーにお貼りいただくなど、服用の確認・記録にご使用ください。




Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

モンテルカスト^{細粒}「DSEP」 の服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決め
ます。
- 1日1回寝る前に服用します。
- スティック分包を開いたら、すぐに
1包全部を飲んでください。
(目安は開封後、15分以内です)
- このお薬は口に直接入れるか、
室温(30℃)以下のスプーン1杯
(約5mL)程度の柔らかい食物、
調製ミルクや母乳と混ぜて飲む
こともできます。
また、服用後に水などを飲ませて
も大丈夫です。
- 2回分を一度に飲まないでください。
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでくだ
さい。
ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回とばして次の
服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談して
ください。



医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、
量を減らしたりすると、ぜんそくの症状が悪化することがあります。
指示どおりに飲み続けることが重要です。