


医療関係者用

プラスグレル錠2.5mg/3.75mg「DSEP」 を服用される患者さんへ



指導箋は1枚ずつはがしてご使用ください。



第一三共エスファ株式会社

プラスグレル錠2.5mg/3.75mg「DSEP」 を服用されている方へ

このお薬は、血栓をできにくくして、血管がつまるのを防ぐお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック(AG※)医薬品です。

□ プラスグレル錠2.5mg「DSEP」

表 裏 側面



□ プラスグレル錠3.75mg「DSEP」

表 裏 側面



*錠剤は実物大です。

服用にあたっての注意点

- 1日1回医師の指示通り、毎日きちんと服用してください。
- 自分の判断で中止したり、服用回数を減らしたりすることは絶対にしないでください。
- 服用し忘れた場合には、気づいたときにすぐに服用してください。
ただし、次の服用時間が近い場合には1回分お休みして、次の服用時間から通常通り1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。

以下のような症状があらわれた場合や、心配なことがある場合は、
遠慮しないで医師にご相談ください。

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 頭痛 | <input type="checkbox"/> 悪心・嘔吐 |
| <input type="checkbox"/> 意識が低下する | <input type="checkbox"/> 手足が動きにくくなる |
| <input type="checkbox"/> 血痰・吐血 | <input type="checkbox"/> 尿が茶色っぽくなる、血が混じる |
| <input type="checkbox"/> あざができる(紫色・赤色) | <input type="checkbox"/> ぶつぶつができる |
| <input type="checkbox"/> 眼や皮膚が黄色くなる | <input type="checkbox"/> 倦怠感(強い疲労感) |
| <input type="checkbox"/> 食欲がなくなる | <input type="checkbox"/> 黒色便や便に血が混じる |



他の病院や診療科、歯科を受診するときは、
プラスグレル錠2.5mg/3.75mg「DSEP」を服用していることを
必ず医師・歯科医師・薬剤師にお伝えください。

※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは?

「許諾を受けたジェネリック医薬品」という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品
と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

プラスグレル錠2.5mg/3.75mg「DSEP」を服用している間は、
血が止まりにくいいため、出血に注意が必要です。
医師や薬剤師の指示を守ってください。

出血時の応急処置

● 外傷で出血したとき



手指やタオルなどで
グッとおさえる(圧迫止血)

● 鼻血が出たとき



うつむいて鼻をおさえる

**血が止まらないときや出血が気になるときは、
自分だけで判断しないで、医師に連絡してください。**

出血を避けるために

- ケガのおそれのある仕事や運動は慎重に行うようにしましょう
- 転倒に注意しましょう
(階段の上り下りは手すりにつかまるように)
- 鼻をかむときはやさしくかみましょう
- ヒゲを剃るときは電気シェーバーを使いましょう
- 歯ブラシは柔らかめを使いましょう



連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPEFTAGIP00301-1

2026年2月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPEFTAGIP00301-1
2026年2月作成