

モンテルカスト チュアブル錠「DSEP」 を服用される小児患者さんご家族の方へ

モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」



*錠剤は実物大です。



モンテルカストチュアブル錠「DSEP」は、
1日1回1錠を寝る前に服用してください。

服薬支援シール

お子様がお薬をのまれた際に、カレンダーにお貼りいただくなど、服用の確認・記録にご使用ください。



第一三共エスファ株式会社

モンテルカスト チュアブル錠「DSEP」 の服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- 1日1回1錠を寝る前に服用します。
- このお薬は口の中で溶かしたり、水なしでかんで飲むことができます。
また、水と一緒に飲んでも大丈夫です。
- 2回分を一度に飲まないでください。
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。



このお薬は
イチゴ味です。



お薬は決まった時間に
飲みましょう

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると、ぜんそくの症状が悪化することがあります。
指示どおりに飲み続けることが重要です。