

# ダバグリフロジン錠5mg/10mg「EP」 を服用される 患者さんにご家族の方へ



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

# ダパグリフロジン錠5mg/10mg「EP」 を服用される患者さんご家族の方へ

このお薬は、腎臓のSGLT2※のはたらきを阻害して尿と一緒に糖を排出することで、血糖値を下げます。[選択的SGLT2阻害剤・2型糖尿病治療薬]

※SGLT2：腎臓で糖とナトリウムを再吸収する役割をもつたんぱく質です。

## ☐ ダパグリフロジン錠5mg「EP」




表



裏



側面



## ☐ ダパグリフロジン錠10mg「EP」



表



裏



側面



## 服用方法について

\*錠剤は実物大です。

# 1日1回 毎日決めた時間に飲みましょう。

**必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。**

- このお薬は、食事に関係なくいつでも飲むことができます。
- 医師の指示がある場合は、それに従ってください。
- 2回分(2日分)を一度に飲まないでください。**
- 飲み忘れに気づき、次の服用時間まで半日以上ある場合は、できるだけ早く1回分を飲んでください。
- 次の服用時間まで半日未満の場合は、1回とばして、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに飲むのを止めないでください。



## 水分補給について

このお薬は、**血糖値が高いほど尿に糖が多く出て尿量が増えるため**、脱水症状があらわれることがあります。以下のような症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

- のどが渇く ■めまいがする ■疲れやすい ■食欲がない など

(裏面も必ずお読みください)

## 服用中に注意していただきたいこと

次の状態の場合には、次の服用の前に、ただちに医師に連絡し、指示に従ってください。

- 熱がある
- 下痢・おう吐などがある
- 食欲がない、食事が十分とれない

## 尿路の感染症(尿道炎、膀胱炎)、性器の感染症(陰カンジダ症など)

- 排尿時の痛み・灼熱感
  - 陰部のかゆみ・痛み
  - トイレに近い など
- (女性の場合) ■ おりもののにおいが強くなる、色が変わる など

### 日頃から次のことに気をつけてください

- トイレを我慢しないようにしましょう。
  - 排尿・排便の後は清潔を保つようにしましょう。
- 下記の症状を伴う場合は、ただちに医療機関を受診してください。

- 寒気、発熱
- 脇腹・背中<sup>じん とう じん せん</sup>の痛み
- 関節・筋肉の痛み
- 陰部の圧痛・赤み・腫れなどが高熱を伴う場合 など

尿路・性器<sup>えい せき</sup>感染症の治療が遅れると、腎盂腎炎<sup>じん ぼう じん せん</sup>／会陰部の壊死性筋膜炎<sup>えい しん せい きん まく うえん</sup>(フルニエ壊疽)、敗血症などの重篤な感染症に至ることがあります。



## 低血糖症状

- 手足のふるえ、冷や汗、顔が蒼白<sup>どう き</sup>い、動悸
- 疲れやすい、不安感 など

低血糖症状は個人差があります。

### 低血糖症状があらわれた場合は？

- 糖質を含む食品や砂糖をすぐにとりましょう。例) ブドウ糖や砂糖を含む飲料水など
- α-グルコシダーゼ阻害剤を併用している場合は、砂糖ではなく、ブドウ糖をとってください。それでも回復がみられない場合は、**早急**に医師にご相談ください。

低血糖症状があらわれたことを診察時、医師に必ず報告してください。また、自分で対応できない場合に備え、低血糖についての注意は、ご家族やまわりの方にもお知らせください。

## ケトアシドーシス\*

\*脂肪酸がエネルギー源として使われるときに、分解物であるケトン体という物質が血液中に溜まると、血液が酸性に傾きます。その状態を「ケトアシドーシス」といいます。

ケトアシドーシスは通常、高血糖がみられますが、このお薬の服用中は、高血糖がみられなくても、これらの症状があらわれることがあります。下記の症状があらわれた場合は、**早急**に医療機関を受診し、ケトン体を測定してもらってください。

- 吐き気、おう吐、食欲がない
- 腹痛
- 激しいのどの渇き
- からだがだるい
- 息切れ
- 意識の低下

### 特にご注意ください

- インスリン製剤を打ち忘れたとき、減量・中止したとき
- 過度な糖質制限(低炭水化物ダイエットなど)を行っているとき[ダイエットなどを行う場合は医師の指示に従い、自己判断で過度な糖質摂取制限を行わないでください。]
- 飲酒したとき
- 過度な運動を行ったとき
- 熱がある、下痢・おう吐などがある、食事がとれない場合

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

# 第一三共エスファ株式会社

EPDAP1P00201-1

2026年6月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)  
**第一三共エスファ株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携  
**第一三共株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1