

『アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」』から

『アビラテロン酢酸エステル錠500mg「DSEP」』に切り替えを行う方へ

アビラテロン酢酸エステル錠「DSEP」の 服用方法と注意点


 1日1回、決められた量を毎日服用します

『アビラテロン酢酸エステル錠「DSEP」』は1日1回、通常1,000mgを服用します。

『アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」』と『アビラテロン酢酸エステル錠500mg「DSEP」』で1回に服用する錠数が異なりますのでご注意ください。なお、『アビラテロン酢酸エステル錠「DSEP」』はプレドニゾロンというお薬を併用しますが、服用のタイミングは必ずしも一緒ではなくて構いません。

アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」は1日1回4錠を服用しますが、
アビラテロン酢酸エステル錠500mg「DSEP」は1日1回2錠を服用します。

アビラテロン酢酸エステル錠
250mg「DSEP」を投与する場合



250mg 錠 4錠 1日1回

(原寸大)

アビラテロン酢酸エステル錠
500mg「DSEP」を投与する場合



500mg 錠 2錠 1日1回

(原寸大)

 その他の注意

- 『アビラテロン酢酸エステル錠500mg「DSEP」』への切り替えは、ご自宅にある『アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」』を全て服用してから行います。
- 『アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」』と『アビラテロン酢酸エステル錠500mg「DSEP」』のどちらを飲めばよいかわからない場合や、飲み忘れてしまった場合は、すぐにかかりつけ医師や薬剤師にご相談ください。




第一三共エスファ株式会社



アビラテロン酢酸エステル錠「DSEP」が 飲みにくいと感じたら

- 錠剤を飲む前に少量の水を飲んで口の中の滑りをよくしておき、コップ1杯程度の水と一緒に、正面向きか少し下向きに顎を引いて飲むようにしましょう（上向きに飲むと気管に入りやすくなります）^{1,2)}。



迫田綾子ほか編集．誤嚥予防，食事のためのポジショニング
POTTプログラム，医学書院，2023．を参考に作成

- 錠剤が飲みにくいと感じたら、医師、薬剤師に相談しましょう。

1) 丸山敬監修．マンガでわかる薬のしくみとはたらき事典，ナツメ社，2020．

2) 迫田綾子ほか編集．誤嚥予防，食事のためのポジショニング
POTTプログラム，医学書院，2023．

連絡先（医療機関名）



第一三共エスファ株式会社

EPAB11P00801-1
2026年10月作成