


アジスロマイシン錠250mg「DSEP」を 服用される患者さんへ

このお薬は、抗生物質です。
1日1回2錠・3日間続けて服用して下さい。

他の医療機関受診の方はこのお薬を服用していたことをお伝えください。

4日目以降も症状の改善のない/不快な症状がみられた/わからないことがある場合は、医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。

お薬を飲み始めた日： 月 日



1日1回2錠・3日間連続の服用で約7日間作用が持続します。

 第一三共エスファ株式会社

EPAZI1P00201-1
2016年9月作成


アジスロマイシン錠250mg「DSEP」を 服用される患者さんへ

このお薬は、抗生物質です。
1日1回2錠・3日間続けて服用して下さい。

他の医療機関受診の方はこのお薬を服用していたことをお伝えください。

4日目以降も症状の改善のない/不快な症状がみられた/わからないことがある場合は、医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。

お薬を飲み始めた日： 月 日



1日1回2錠・3日間連続の服用で約7日間作用が持続します。

 第一三共エスファ株式会社

EPAZI1P00201-1
2016年9月作成


アジスロマイシン錠250mg「DSEP」を 服用される患者さんへ

このお薬は、抗生物質です。
1日1回2錠・3日間続けて服用して下さい。

他の医療機関受診の方はこのお薬を服用していたことをお伝えください。

4日目以降も症状の改善のない/不快な症状がみられた/わからないことがある場合は、医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。

お薬を飲み始めた日： 月 日



1日1回2錠・3日間連続の服用で約7日間作用が持続します。

 第一三共エスファ株式会社

EPAZI1P00201-1
2016年9月作成


アジスロマイシン錠250mg「DSEP」を 服用される患者さんへ

このお薬は、抗生物質です。
1日1回2錠・3日間続けて服用して下さい。

他の医療機関受診の方はこのお薬を服用していたことをお伝えください。

4日目以降も症状の改善のない/不快な症状がみられた/わからないことがある場合は、医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。

お薬を飲み始めた日： 月 日



1日1回2錠・3日間連続の服用で約7日間作用が持続します。

 第一三共エスファ株式会社

EPAZI1P00201-1
2016年9月作成