致服用者

紧急避孕药

LEVONORGESTREL TABLET “FUJINAGA”

的服用方法

此药是避孕失败后或未避孕性交后紧急使用的避孕药。

服用方法

Levonorgestrel tabret 1.5mg "FUJINAGA" 是白色的片剂，

每板装有 1 片（一次用量）。

在性交后 72 小时以内，服用 1 片。



●请在性交后 72 小时以内服用。

服用时间或时间段没有特别规定，但请尽快服用。

服用后注意事项

■ 服用此药并不能完全避免怀孕。

■ 服用此药后，也有怀孕的可能性，请做好适当的避孕措施。

■ 服用此药后，有可能出现类似月经出血（撤退性出血）的现象。

此外，还可能出现不规则子宫出血或头痛、恶心、疲倦、嗜睡等月经时的症状。

如果症状持续，请咨询医生。

■ 服用此药后，月经周期或出血的状况（天数或出血量）会出现一时性的变化。

■ 不规则子宫出血或妊娠初期的出血，与通常的月经出血很难区别，无论有无出血，

请遵照医生指示再次就医。

■ 此药的成分会转移至乳汁中，授乳中的妇女，服用后至少 24 小时请勿授乳。

藤永製薬株式会社
URL https://fujinaga-pharm.co.jp/

第一三共エスファ株式会社
URL https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/

EPLEO1P00401-1
2026年11月作成