


# シロドシン錠「DSEP」/シロドシンOD錠「DSEP」

を服用される患者さんにご家族の方へ

**このお薬は、前立腺肥大症に伴う排尿障害を  
改善させるお薬です。**

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の  
オーソライズド・ジェネリック(AG※)医薬品です。



●錠剤は実物大です。

## ※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは？

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。  
先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および  
製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

## シロドシン錠「DSEP」/シロドシンOD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 立ちくらみのある方
- 肝臓、腎臓の病気にかかっている方
- 他のお薬を服用している方

### 服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- このお薬は1日2回、朝・夕食後に服用します。
- OD錠は口の中で溶かして飲むお薬です。舌の上で、だ液を含ませて舌で軽くつぶし、だ液で飲み込みます。コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。寝たままの状態では水なしで飲まないでください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**飲み忘れた場合は、その回は飲まずにとばして、次の決められた時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

### 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

口の渇き、下痢、軟便、立ちくらみ、ふらつき、鼻づまり、頭痛、からだがだるい、白目が黄色くなる、意識がなくなるなどの症状があらわれることがあります。

### その他の重要な注意

- **射精障害**が起こることがあるので、十分に理解できるまで説明を受けてください。
- 起立時に血圧低下があらわれることがあります。起き上がる際には注意してください。
- めまいなどがあらわれることがあります。高所作業や車の運転など危険を伴う機械操作には十分注意してください。



ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPURAG1P00101-1

2019年2月作成