

## 大切なお知らせ

# シロドシン錠「DSEP」/シロドシンOD錠「DSEP」 を服用される患者さんへ

このお薬を服用することによって、射精時の精液量が減るなどの射精障害が起こることがあります。

### ! 主な副作用は？

- ✓ 射精時の精液量が少なくなる
- ✓ 立ち上がった時にふらつく  
(ふらつき、めまい、立ちくらみ※)
- ✓ 下痢や軟便になる
- ✓ 口の中が乾く(口渇)
- ✓ 鼻が詰まる(鼻閉)



### 📖 射精障害とは？

精管、精囊、膀胱頸部(膀胱出口)の収縮が抑えられるため、射精時の精液の量が減少したり、全く出なくなったりする現象です。勃起障害(ED)ではありません。また、健康に害を及ぼすものではありません。

※高所作業や自動車の運転などの危険を伴う作業に従事される方は、主治医にご相談ください。

### ! 射精障害が起こった時の注意は？

射精時の精液量減少以外に症状はありません。

休薬により回復します。ただし子供を望む場合や精液量の減少が気になる方は、主治医にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

裏面も必ずお読みください

大切なお知らせ

# 眼科を受診され、 目の手術を受けるご予約の患者さんへ

このお薬 ( $\alpha 1$  遮断薬) は、前立腺肥大症の治療で多く使われている薬剤です。

## ! 重要な注意事項

$\alpha 1$  遮断薬を服用している方が白内障などの手術を受けると、**術中虹彩緊張低下症候群 (IFIS)** と呼ばれる合併症をおこしやすくなると報告されています。

このお薬を服用している(または服用したことがある)方で白内障などの手術を検討する際には、**眼科の先生に服用している(服用したことがある)ことをお伝えください。**



### 術中虹彩緊張低下症候群 (IFIS) とは

$\alpha 1$  遮断薬を服用している方で、白内障手術中に起こる副作用です。虹彩が弛緩・膨張したり、瞳孔が小さくなって、手術がやりにくくなる現象です。

連絡先 (医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPURAG1P00201-1

2019年3月作成