

デュタステリド[®]カプセル0.5mg AV「DSEP」

を服用される
患者さんにご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

デュタステリド[®]カプセル0.5mg AV「DSEP」

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は前立腺肥大症の治療に用いられます。

デュタステリドカプセル0.5mg AV「DSEP」



*カプセルは実物大です。

デュタステリドカプセル0.5mg AV「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 肝臓の病気にかかっている方
- AGA(男性型脱毛症)の医療用医薬品を服用している方
- 他のお薬を服用している方

この薬を使用する前に、直腸診や他の前立腺癌の検査が行われます。
また、この薬を使用中でも定期的にこれらの検査が行われます。

重要な注意事項

- カプセルを噛んだり開けたりせずに、水またはぬるま湯で飲んで下さい。
- 皮膚から吸収されるので、女性や小児において、カプセルから漏れた薬剤に触れた場合には、直ちに石鹸と水で洗ってください。



(裏面も必ずお読みください)

服用方法について

- このお薬は1日1回服用します。
- カプセルの内容物は口咽頭粘膜を刺激することがあるので、カプセルを噛んだり、開けたりせずに飲んでください。
- 2回分を一度に飲まないでください。**
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

勃起不全、リビドー（性欲）減退、乳房障害（女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感）などの症状があらわれることがあります。

まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 食欲不振、全身倦怠感、皮膚や粘膜が黄色くなる（肝機能障害、黄疸）



食欲不振



全身倦怠感



黄疸

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

そのほか注意していただきたいこと

- PSA（前立腺特異抗原）検査を行う際は、本剤を服用中であることを、必ず担当の医師にお伝えください。

保管方法その他

- 乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。
- 包装から取り出さず、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については、受け取った薬局や医療機関に相談してください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPDUTIP00401-1

2020年6月作成

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPDUTIP00401-1

2020年6月作成