

# プレガバリンOD錠「DSEP」

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、神経の痛みを和らげるお薬です。



●錠剤は実物大です。

## プレガバリンOD錠「DSEP」を服用される前に


次のような方は服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 腎機能障害、うっ血性心不全、血管浮腫の既往などがある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方(薬局で購入したお薬も含みます)

(裏面も必ずお読みください)

## 服用方法について

- このお薬は、痛いときだけに服用するお薬（頓服）ではありません。**一定期間服用を続けることで効き目があらわれます。**また、医師の指示通りに服用を続けてください。
- 少なめの量から開始し、徐々に量を増やしていきます。
- この薬は水と一緒になくても飲めるタイプの薬です。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲んでください。
- **絶対に2回分を一度に飲まないでください。**飲み忘れた場合は、気がついた時に1回飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間から1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。



医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると、病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

## 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状など、気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

めまい、傾眠（眠気）、浮腫、体重増加、意識がなくなる、呼吸困難、むくみ、動悸、筋肉痛、けんたい感、じんましんなどの症状があらわれることがあります。また、急に服用を中止すると、頭痛や下痢などがあらわれることがあります。

## その他の重要な注意

- めまいや傾眠（眠気）などがあらわれることがあります。転倒などの危険がありますので、特に高齢の方は十分に注意してください。また、自動車の運転など、危険を伴う機械の操作は行わないでください。
- アルコール飲料は、このお薬に影響しますので控えてください。
- 服用中に妊娠された場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。授乳中の方は、授乳を避けてください。



連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPPRE1P00101-1

2020年11月作成