

# プロナセリン錠「DSEP」

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達物質に働いて、強い不安や緊張感を和らげるお薬です。



●錠剤は実物大です。

## プロナセリン錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、喘息、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中である方
- 他のお薬を使用している方

(裏面も必ずお読みください)



## 服用方法について

- このお薬は通常1日2回、食後に服用します。服用量は患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- 空腹時に飲むと、期待した効果を得られないことがあるため、必ず食後に飲んでください。
- **絶対に2回分を一度に飲まないでください。**
- 飲み忘れた場合には、気がついた時点で食後に1回分を飲んでください。次に飲む時間が近い場合は服用しないで、その後は指示された時間に飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止しないでください。



## 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- 眠気、不安や焦燥感、イライラしやすい、発疹、湿疹、かゆみなどの症状が出ることがあります。
- 急激な発熱、筋肉のこわばり、手足のふるえ、食欲不振、吐き気・嘔吐、けいれん、自分の意思とは無関係に絶え間なく口の周りや顔が動いてしまう（不随意運動）場合には、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。



## その他の重要な注意

- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがありますので、このお薬を服用している間は自動車の運転や危険を伴う機械の操作などをしないようにしてください。
- アルコールはお薬に影響しますので、お薬といっしょに飲まないでください。
- グレープフルーツジュースはお薬に影響しますので、お薬といっしょに飲まないでください。

ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、医師または薬剤師にご相談ください。



連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPBL01P00101-1

2019年5月作成