

メマンチン塩酸塩錠「DSEP」 を服用される方と ご家族・介護者の方へ



第一三共エスファ株式会社

メマンチン塩酸塩錠「DSEP」

を服用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬はアルツハイマー型認知症の
認知症症状の進行を遅らせるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック (AG※) 医薬品です。

メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」



メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」



メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」



*錠剤は実物大です。

メマンチン塩酸塩錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 肝臓・腎臓の病気にかかっている方
- 尿管管性アシドーシス、尿路感染がある方
- てんかん又はけいれんを起こしたことのある方
- 他のお薬を服用している方

※オーソライズド・ジェネリック (AG) とは？


『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が
先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

服用方法について

- このお薬は1日1回服用します。
- このお薬は5mgから開始し、1週間に5mgずつ増量します。維持量は20mgです。



- 2回分を一度に飲まないでください。**
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、ご自分やご家族・介護者の判断でお薬の量を加減したり飲むのをやめないでください。

服用中に注意していただきたいこと

飲み始めには、**めまい**が起こることがあり、
そのほか、**眠くなる**ことがありますので、注意してください。



次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

めまい、便秘、体重減少、頭痛、食欲不振、血圧上昇、転倒、浮腫などの症状があらわれることがあります。

まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- けいれん ■失神、意識消失
- 感情や声の激しい高ぶり、自分または他人への攻撃、根拠のない思い込み
- 全身倦怠感、皮膚や目が黄色くなる(肝機能障害、黄疸)
- 筋肉痛、力が抜ける、赤褐色の尿(横紋筋融解症)

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPMEMAGIP00401-1

2020年7月作成

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPMEMAG1P00401-1

2020年7月作成