

**オランザピン錠/OD錠/細粒「DSEP」
を服用される
患者さんにご家族の方へ**



第一三共エスファ株式会社

オランザピン錠/OD錠/細粒「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用して、強い不安感やイライラする症状を改善し、気分を安定させるはたらきがあります。

<p><input type="checkbox"/> 錠2.5mg</p> <p>表 裏 側面</p> 	<p><input type="checkbox"/> 錠5mg</p> <p>表 裏 側面</p> 	<p><input type="checkbox"/> 錠10mg</p> <p>表 裏 側面</p> 
<p><input type="checkbox"/> OD錠2.5mg</p> <p>表 裏 側面</p> 	<p><input type="checkbox"/> OD錠5mg</p> <p>表 裏 側面</p> 	<p><input type="checkbox"/> OD錠10mg</p> <p>表 裏 側面</p> 
<p><input type="checkbox"/> 細粒1%</p>  <p>このお薬には、錠剤と粉薬がありますが、有効成分は同じです。</p> 		

*錠剤は実物大です。

オランザピン錠/OD錠/細粒「DSEP」を服用される前に

- 次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。
- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
 - 昏睡状態にある方
 - 糖尿病またはその既往歴がある方
 - 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
 - 他のお薬を服用している方
- (お互いの薬の作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、一般用医薬品も含めて他に使用している場合や新たに使用する場合は注意してください。)
- (裏面も必ずお読みください)



服用方法について

このお薬は徐々に飲む量を増やしながら、患者さんの症状により医師が必要な量を調整していきます。症状を改善させるには、医師により決められた量のお薬を続けて服用することが大切です。

飲み忘れた場合

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の時間に1回分を飲んでください。




服用中に注意していただきたいこと

お薬を服用中に、**血糖値の上昇や体重の増加**がみられることがあります。

ご親族に糖尿病の患者さんがいる方、血糖値が高いといわれたことのある方、肥満傾向の方は、**血糖値や体重の変化に十分気をつけてください。**

血糖値が上昇すると次のような症状があらわれる場合があります。このような症状がみられたら、必ずすぐに医師に連絡し、早めに診察を受けるようにしてください。



急に体重が変わる



のどが渇く



何回もトイレに行く

この他にも、体調に変化があった場合や気になることがありましたら、医師や薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPOLAIP00501-1

2017年12月作成

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPOLAIP00501-1

2017年12月作成