


# ガランタミンOD錠「DSEP」 を服用される方と ご家族・介護者の方へ



第一三共エスファ株式会社

# ガランタミンOD錠「DSEP」

を服用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬はアルツハイマー型認知症の  
認知症症状の進行を遅らせるお薬です。

## □ ガランタミンOD錠4mg「DSEP」



## □ ガランタミンOD錠8mg「DSEP」



## □ ガランタミンOD錠12mg「DSEP」



\*錠剤は実物大です。

## ガランタミンOD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が  
でたことのある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 心臓・肝臓・腎臓・呼吸器系・消化器系・泌尿器系・  
パーキンソン病・パーキンソン症候群の病気にかかっている方、  
または過去に病気にかかった方
- てんかんなどのけいれんを起こす病気にかかっている方、  
または過去に起こしたことがある方
- 他のお薬を服用している方



(裏面も必ずお読みください)

## 服用方法について

- このお薬は1日2回食後に服用します。
- このお薬は1日8mg(1回4mgを1日2回)から開始し、4週間後に1日16mg(1回8mgを1日2回)に増量します。症状に応じて医師の判断により1日24mg(1回12mgを1日2回)まで増量します。

0～4週

8mg/日

4週間後～

16mg/日

- 必ず指示された服用方法に従ってください。

医師判断により1日24mgまで増量。  
(増量する場合は、変更前の用量を4週間以上飲んだ後に増量する)

- 唾液や水で飲みこんでください。ただし、寝たままの状態では、唾液ではなく水で服用してください。
- 2回分を一度に飲まないでください。  
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、ご自分やご家族・介護者の判断でお薬の量を加減したり飲むのをやめないでください。



## 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、頭痛などの症状があらわれることがあります。

まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 気を失う、息切れ、めまい〔徐脈、心ブロック、QT延長〕
- 発熱、皮膚の赤い発疹、水疱が化膿してうみをもった小さい発疹〔急性汎発性発疹性膿疱症〕
- 体がだるい、吐き気〔肝炎〕
- 手足の筋肉のいたみ、こわばり、しびれ〔横紋筋融解症〕
- 体重が減った場合

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPGALIP00201-1

2020年7月作成

製造販売元

**第一三共エスファ株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1



Daiichi-Sankyo

販売提携

**第一三共株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPGAL1P00201-1

2020年7月作成