

# オランザピン錠/OD錠/細粒「DSEP」 を服用される

## 患者さんにご家族の方へ

〈双極性障害〉



第一三共エスファ株式会社

# オランザピン錠/OD錠/細粒「DSEP」 を服用される患者さんご家族の方へ


## 〈双極性障害〉



### 双極性障害とは？

双極性障害は、「躁状態」と呼ばれる気分が高ぶったときと、「うつ状態」と呼ばれる気分が低下したときが、交代して起こる病気です。

躁状態やうつ状態が治まったときには何の症状もなく、躁状態でもうつ状態でもないので、病気でない人と同じく変わりがないのも、この病気の特徴です。



#### 躁状態の症状

- 気分が高まって、活動的になる
- 興奮しやすく怒りっぽくなる
- 少ししか眠らなくても平気
- 自分が偉くなったように感じる
- いつもよりおしゃべりになる
- 次々にいろいろな考えが浮かぶ

#### うつ状態の症状

- 気分が落ち込む
- ほとんどのことに興味がなくなる
- 1日中寝ている
- 思考力や集中力がなくなる
- 疲れやすい
- 死にたくなる



### 双極性障害の治療を行う上で大切なこと

#### ★治療を続けることが肝心

双極性障害は再発することが多い病気です。症状が良くなっても、再発予防のために治療を続けることが大切です。

#### ★正しい治療で再発を予防

双極性障害は、きちんと治療すれば改善できる病気ですが、症状がおさまったからといってお薬を止めてしまったり、飲む量を減らしてしまうと再発するおそれがあります。飲み忘れにも注意しましょう。

#### ★生活のリズムを整える

規則正しい生活をするのが大切です。忙しい時でも睡眠時間は確保しましょう。

#### ★再発のサインを知っておく

過去に再発した時を振り返って、躁状態またはうつ状態を引き起こしやすいストレスと症状を記録しておき、ご家族と一緒に話し合っておきましょう。



(裏面も必ずお読みください)

このお薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用して、強い不安感やイライラする症状を改善し、気分を安定させるはたらきがあります。



## オランザピン錠/OD錠/細粒「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 昏睡状態にある方
- 糖尿病またはその既往歴がある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方

(お互いの薬の作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、一般用医薬品も含めて他に使用している場合や新たに使用する場合は注意してください。)



## 服用方法について

このお薬は徐々に飲む量を増やしながら、患者さんの症状により医師が必要な量を調整していきます。症状を改善させるには、医師により決められた量のお薬を続けて服用することが大切です。

### 飲み忘れた場合

**決して2回分を一度に飲まないでください。**

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の時間に1回分を飲んでください。



## 服用中に注意していただきたいこと

お薬を服用中に、血糖値の上昇や体重の増加がみられることがあります。服用中は、**血糖値や体重の変化に十分気をつけてください。**

血糖値が上昇すると右のような症状があらわれる場合があります。このような症状がみられたら、必ずすぐに医師に連絡し、早めに診察を受けるようにしてください。



急に体重が変わる

のどが渇く

何回もトイレに行く

この他にも、体調に変化があった場合や気になることがありましたら、医師や薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPOLAIP00601-1

2017年12月作成

製造販売元

**第一三共エスファ株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

**第一三共株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPOLAIP00601-1

2017年12月作成