

ドネペジル塩酸塩OD錠「DSEP」

を服用される方と ご家族・介護者の方へ

〈アルツハイマー型認知症〉



第一三共エスファ株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠「DSEP」

を服用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬はアルツハイマー型認知症における
認知症症状の進行を遅らせるお薬です。

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」



表



裏



側面



ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」



表



裏



側面



ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」



表



裏



側面



*錠剤は実物大です。

ドネペジル塩酸塩OD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 心臓・呼吸器系・消化器系・パーキンソン病・パーキンソン症候群の病気にかかっている方、または過去に病気にかかった方
- 他のお薬を服用している方



(裏面も必ずお読みください)

服用方法について

- このお薬は1日1回服用します。
- このお薬は、3mgから開始し、1～2週間後から5mgに増量します。さらに病状が高度に進行した場合には、医師判断により10mgまで増量します。その後、症状に応じて適宜減量します。

最初の1～2週間

3mg/日



その後

5mg/日

●必ず指示された服用方法に従ってください。

症状が高度に進行した場合、
医師判断により1日10mgまで増量。
(増量する場合は、5mgを4週間以上
飲んだ後に増量する)

- 唾液や水で飲みこんでください。ただし、寝たままの状態で服用する場合は、唾液ではなく水で服用してください。
- 2回分を一度に飲まないでください。**
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、ご自分やご家族・介護者の判断でお薬の量を加減したり飲むのをやめないでください。

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、腹痛、発疹、そう痒、興奮、不穏、不眠、徘徊などの症状があらわれることがあります。



まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 気を失う、胸痛、呼吸困難 (QT延長、高度徐脈、心ブロック、心不全、心筋梗塞など)
- 胸やけや腹痛、黒色便や血便、発熱 (消化性潰瘍、消化管出血など)
- 吐き気・嘔吐、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる (肝炎、肝機能障害、黄疸)
- けいれん、激しい頭痛、吐き気・嘔吐 (脳性発作、脳出血、脳血管障害)
- 緩慢な動作、不随意運動、筋肉の異常な収縮、手足のふるえ (錐体外路障害)
- 高熱、筋肉のこわばり、意識がもうろうとする (悪性症候群)
- 体重が減った場合

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPDON1P01101-1

2020年7月作成

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPDON1P01101-1

2020年7月作成