

アナストロゾール錠「DSEP」 を服用される 患者さんとご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

アナストロゾール錠「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、乳がん治療薬のうちホルモン療法剤と呼ばれるお薬です。
エストロゲン(女性ホルモン)がつけられるのを抑制して、
乳がん細胞の増殖を抑えます。閉経後の乳がん患者さんに使用します。
先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック(AG)医薬品です。



*錠剤は実物大です。

服用中に注意していただきたいこと

からだや顔がほてる、多汗、関節痛、発疹、かゆみ、からだがだるい、頭痛、吐き気などの症状があらわれることがあります。



〈ほてり〉



〈関節痛〉



〈かゆみ〉

まれに次のような症状があらわれることがあり、〔 〕内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合は、服用をやめてすぐに医師の診察を受けてください。

- 発熱、眼の充血、唇や口内のただれ、赤い発疹や水ぶくれがある〔皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)〕
- 全身のかゆみ、発疹、唇・舌などの腫れ、ふらつき、動悸、息切れがある〔アナフィラキシー、血管浮腫、じんましん〕
- からだのだるい、食欲がない、皮膚や白目が黄色くなる〔肝機能障害、黄疸〕
- 発熱、から咳がでる、息切れがある〔間質性肺炎〕
- 頭痛、吐き気があり、下肢などの局所の痛み、むくみ、息切れがある〔血栓塞栓症〕

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

(裏面も必ずお読みください)

アナストロゾール錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用してかゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 肝臓や腎臓の病気にかかっている方
- 他のお薬を服用している方



服用方法について

必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ご自身の判断で、服用する量や回数を変更しないでください。
- このお薬は、毎日つづけて服用することが大切です。
医師または薬剤師の指示なしに、途中で服用するのをやめたりしないでください。
- 2回分を一度に飲まないでください。**飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の服用時間がせまっている場合は1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を服用します。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

生活上の注意点

- お薬の作用により、骨折や骨粗しょう症などが起こりやすくなる場合があります。治療中は、積極的なカルシウム、ビタミンDやビタミンKなどの摂取や適度な運動を行い、骨折や骨粗しょう症の予防に心がけましょう。
- 力が入らない、眠気があらわれたりすることがありますので、車の運転や機械を操作するときは十分に注意してください。

保管方法その他

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、湿気を避け、室温にて保管してください。
- 包装から出してお薬のまま保管しないでください。
- 他の人には絶対に渡さないでください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

オーソライズド・ジェネリック (AG) とは？

『きよたく許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPANAIP00201-1

2019年5月作成

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPANA1P00201-1

2019年5月作成