

.....

**プラミペキソール塩酸塩錠「DSEP」**  
**プラミペキソール塩酸塩LA錠MI「DSEP」**  
**を服用される**  
**患者さんにご家族の方へ**

.....



**第一三共エスファ株式会社**

# プラミペキソール塩酸塩錠「DSEP」 プラミペキソール塩酸塩LA錠MI「DSEP」 を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達物質であるドパミンの受容体に作用して、ふるえ、筋肉のこわばり、動作が遅くなる、姿勢の障害などの症状を改善します。

□ プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」



□ プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」



□ プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」



□ プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」



\*錠剤は実物大です。

## プラミペキソール塩酸塩錠/LA錠MI「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことがある方
- 幻覚、妄想などの症状がある方、または過去にこれらの症状がでたことがある方
- 腎臓の機能が低下している方
- 心臓に障害がある方、または過去にこれらの既往があった方
- 低血圧症の方
- 高齢の方
- 他のお薬を服用している方

## 車の運転等はしないでください。

- このお薬を飲むと、眠くなったり、前ぶれもなく急に眠り込んでしまうこと、また、めまいや立ちくらみ、ふらつき、失神が起こることがあります。
- 車の運転や危険を伴う機械の操作、高い場所での作業などはしないでください。
- もしこのような症状があらわれた場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。



(裏面も必ずお読みください)

## 服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- 2回分を一度に飲まないでください。**
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。  
ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。
- プラミペキソール塩酸塩LA錠MI「DSEP」は、**嘔まずに飲んでください。**

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

## 特に注意していただきたい副作用

次のような症状が起こった場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- 欲求や行動が抑えられなくなる(衝動制御障害)**

このお薬はドパミン受容体作動薬と呼ばれるグループに属するお薬です。ドパミン受容体作動薬を飲むと、社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進したりする『**衝動制御障害(病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等)**』が起こることがあります。



- 急な眠り込み
- 幻覚や妄想
- めまいや立ちくらみ
- 発熱や意識がぼんやりした状態
- 筋肉のこわばりがひどい状態



この説明に書いてあることは、特に注意していただきたいことです。  
この他にも気になる症状がでた場合やこのお薬について何か分からないことがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPPRAIP00201-1

2016年12月作成

製造販売元

**第一三共エスファ株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

**第一三共株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPPRAIP00201-1

2016年12月作成